

# Lichen scléreux - Plan thérapeutique



## 1. Traitement d'attaque

**Propionate de clobétasol 0,5 mg/g (p.ex. Dermovate<sup>®</sup> / Dermoval<sup>®</sup>) Cortisone classe IV**

**OU furoate de mométasone (p.ex. Elocom<sup>®</sup>), Béthametasone (p.ex. Diprosone<sup>®</sup>) Cortisone classe III**

*ou traitement 2<sup>nd</sup> line: médication non stéroïdale / Immunosuppresseurs/immunomodulateurs > Inhibiteurs de la calcineurine p.ex. Protopic<sup>®</sup> / Elidel<sup>®</sup>*

**12 semaines 1 x par jour (total max. 20 – 25g sur 12 semaines)**

**+**

**Soins quotidiens avec pommades émoullientes, onguents, huiles, plusieurs fois par jour**

plus de symptômes

avec symptômes persistants

## 2. Thérapie d'entretien

**Propionate de clobétasol 0,5 mg/g (p.ex. Dermovate<sup>®</sup> / Dermoval<sup>®</sup>) Cortisone classe IV**

**OU furoate de mométasone (p.ex. Elocom<sup>®</sup>), Béthametasone (p.ex. Diprosone<sup>®</sup>) Cortisone classe III**

*ou traitement de 2<sup>nd</sup> line: médication non stéroïdale / Immunosuppresseurs/immunomodulateurs > Inhibiteurs de la calcineurine p.ex. Protopic<sup>®</sup> / Elidel<sup>®</sup>*

**2 x par semaine**

**+**

**Soins quotidiens avec pommades émoullientes, onguents, huiles, plusieurs fois par jour**